

日本標準商品分類番号

872616

外用消毒剤

0.025%ベンザルコニウム塩化物製剤

第3類医薬品

スワブスティックベンザルコニウム

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【特徴】

本品は、薬剤（0.025%ベンザルコニウム塩化物）と綿棒を別々の区画に包装した完全個包装の消毒剤です。使用する直前に、薬剤を綿棒にしみ込ませて使用します。個包装のため携帯に便利です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどい火傷の人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は販売登録者に相談してください。

【成分・分量】

有効成分 100mL中 濃ベンザルコニウム塩化物液（50%）を0.05mL含有

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を付属の綿棒を用いて、患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- 1) 本剤は、本体及び外箱に表示されてある使用方法に従って、使用してください。
- 2) 本剤は、1包につき1回の使用とし、内包装を開封後はできるだけ速やかにお使いください。
- 3) 本剤は外用だけに使用し、内服、洗腸には使用しないでください。
- 4) 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがありますので、注意してください。
- 5) 粘膜・創傷面又は炎症部位に長時間又は広範囲に使用しないでください（全身吸収による筋脱力を起こすおそれがあります）。
- 6) 密封包帯・ギブス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがありますので、使用しないことが望まれます。
- 7) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 8) 石けん等との併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落としてから使用してください。
- 9) 定められた用法・用量を厳守してください。
- 10) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 皮革製品に付着した場合は、変質させることがありますので注意してください。
- (6) 染色した布地は退色することがありますので注意してください。

【製造販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社
〒861-0136
熊本県熊本市北区植木町岩野45
電話 096 (272) 0691

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

