

ご使用に際して、この面を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤 **滅菌済****第2類医薬品**

# スワブパッド ヘキシジン0.2%

(0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩含浸布)

## 【特徴】

本品は、0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩液を不織布に湿潤させた単包装(1回使用)の消毒剤です。

 **使用上の注意**
 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 損傷のある皮膚。  
(2) 目の周囲、粘膜等。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

## 【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 本剤は本体及び外包装袋に表示されてある用法・用量に従って、使用してください。
- 2) 本剤は、1包につき1回の使用とし、内包装を開封後はできるだけ速やかにお使いください。
- 3) 本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや口腔等の粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。
- 4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 5) 定められた用法・用量を厳守してください。
- 6) 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
使用期限は内包装に記載しております。

## 【包装】

不織布1枚入：150包入

## 【消費者相談窓口】

リバテープ製薬株式会社 メディカル営業部  
〒861-0136  
熊本県熊本市北区植木町岩野45番地  
電話 096(272)0691

## 【製造販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社  
〒861-0136  
熊本県熊本市北区植木町岩野45番地  
電話 096(272)0691

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

## 【成分・分量】

有効成分 100mL中クロルヘキシジングルコン酸塩液  
(20%)1mL含有

担体 不織布：1枚  
液量 1.1mL

## 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒